

BLOC DIFENACOUM

Puissant raticide et souricide en bloc

Spécial collectivités

CARACTERISTIQUE PHYSICO – CHIMIQUES :

Type de produit : TP14 – Rodenticide

Type de formulation : prêt à l'emploi (RB)

Substance active : Difenacoum N°CAS 56073-07-5

Concentration : 0.0025% m/m

Amérisant : Benzoate de denatonium 10 ppm

INFORMATIONS REGLEMENTAIRES :

N° AMM : FR-2013-0041 / Professionnels et non professionnels de la lutte contre les rongeurs.

CIBLE : rats noirs, rats bruns, souris.

Application : Utilisation à l'intérieur, à l'extérieur autour des bâtiments et dans les zones ouvertes contre les rats et les souris, et dans les décharges extérieures et déchetteries contre les rats.

MODE D'ACTION :

- Le Difenacoum est un anticoagulant de deuxième génération.
- Les rongeurs meurent d'hémorragies internes. Les 1^{er} symptômes apparaissent quelques heures après l'ingestion et la mort survient en moyenne 4 à 10 jours plus tard.



CONDITIONNEMENT :

Colis de 10 kg – Blocs de 30g + sachets zippés pour la distribution

MODE ET DOSES D'EMPLOI

Le port des gants est recommandé. Le produit doit être utilisé dans des postes d'appâtage sécurisés ou points d'appâts couverts et protégés. Le nombre de points d'appâtage est fonction du site du traitement, du contexte géographique, de l'importance et de la gravité de l'infestation.

- Contre les rats :** 90g d'appât par point d'appât espacés de 5 à 10 mètres en fonction du niveau d'infestation.
- Contre les souris :** 30g d'appât par point d'appât espacés de 3 à 5 mètres en fonction du niveau d'infestation.
- Contre les mulots :** 50g d'appât par poste d'appâtage. Si plusieurs postes sont nécessaires, la distance minimale séparant 2 postes doit être de 2 à 5 mètres.

Adapter la quantité d'appât au traitement à effectuer. Ne pas ouvrir les sachets.

Inspecter et réapprovisionner les boîtes d'appâts quelques jours après la 1^{ère} application puis une fois par semaine tant que l'appât est consommé. Retirer toutes les boîtes d'appâts après la fin du traitement. Se laver les mains après utilisation.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Envisager l'adoption de mesures de contrôle préventives (combler les trous, retirer autant que possible les aliments et boissons éventuels, etc.) pour améliorer l'ingestion du produit et réduire le risque de nouvelle infestation.

Rechercher et éliminer les cadavres de rongeurs pendant le traitement.

ELIMINATION

Ne se débarrasser de ce produit qu'en prenant toutes précautions d'usage. Ne pas rejeter le produit dans l'environnement ou les canalisations. L'emballage ayant été en contact avec le produit ne doit pas être réutilisé, ni recyclé.

